

GINAL CENT®

METRONIDAZOL - MICONAZOL -
NEOMICINA - CENTELLA ASIATICA -
POLIMIXINA

FORMULA

Cada cápsula blanda vaginal contiene:

Metronidazol.....	400 mg
Nitrato de miconazol.....	100 mg
Sulfato de neomicina.....	45 mg
Centella asiática.....	15 mg
Sulfato de polimixina B.....	5 mg
Vaselina líquida, vaselina sólida, gelatina, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, amarillo ocaso y dióxido de titanio.....	c.s.

ACCION TERAPEUTICA

GINAL CENT® contiene una asociación de principios activos con acción antimicótica y antimicrobiana para el tratamiento de afecciones ginecológicas vulvovaginales. GINAL CENT® contiene también Centella asiática, con acción regeneradora y reparadora del epitelio vaginal.

INDICACIONES

Tratamiento local de las micosis vulvovaginales, vaginitis a Trichomonas y vaginitis no específicas en las que se presume sobreinfección con gérmenes sensibles a la neomicina o a la polimixina.

CAPSULAS BLANDAS VAGINALES

Venta bajo receta
Industria Argentina

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION

La posología recomendada es de 1 o 2 cápsulas blandas diarias por vía vaginal, durante 7 a 10 días. En la vaginitis a Trichomonas se recomienda asociar tratamiento oral. Colocar una cápsula blanda por la noche antes de acostarse, introduciéndola en forma bien profunda dentro de la vagina. No repetir el tratamiento más de 2 a 3 veces por año.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del medicamento. Primer trimestre del embarazo. Insuficiencia hepática severa. Enfermedades del sistema nervioso central. Utilización de diafragma o preservativos de látex.

ADVERTENCIAS

El uso de GINAL CENT® no previene el contagio de enfermedades transmisibles sexualmente. No usar si se desea un embarazo, ya que puede dificultar la fecundación.

PRECAUCIONES

Se debería interrumpir el tratamiento en caso de aparición de ataxia, vértigo o confusión mental. Controlar la fórmula leucocitaria en casos de antecedentes de trastornos hematológicos.



LABORATORIOS BETA S.A.

Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.

Director Técnico: Gustavo R. Potes - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio
de Salud. Certificado N° 49.305.

Elaborado en Av. Márquez N° 691 - Villa Loma Hermosa
Provincia de Buenos Aires.

255152-h

Interacciones

Espermicidas. A pesar de que las tasas de absorción sistémica de los agentes activos de GINAL CENT® por vía tópica son muy bajas, se deberá tener en cuenta la posible interacción con anticoagulantes, sulfamidas, hipoglucemiantes, fenitoína y astemizol. No es aconsejable durante el tratamiento la ingestión de bebidas alcohólicas ni la administración de warfarina, disulfiram o cumarina.

REACCIONES ADVERSAS

En escaso porcentaje de pacientes puede presentarse ardor o prurito vaginal, trastornos digestivos, náuseas, gusto metálico, anorexia, vómitos y diarrea.

SOBREDOSIFICACION

Si se administra por vía vaginal y en la dosis indicada, no existe riesgo de sobredosis. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital General de Niños "**Dr. Ricardo Gutiérrez**"

Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital General de Niños "**Dr. Pedro de Elizalde**"

Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional "**Prof. A. Posadas**"

Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Pediatría "**Sor María Ludovica**"

Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACION

Envases con 6 cápsulas blandas vaginales.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en ambiente fresco, a temperaturas inferiores a los 30 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 12.00.