

# MEDILAXAN®

## MUCILAGO DE LLANTEN

### SENOSIDOS A y B

GRANULADO

Venta bajo receta

Industria Argentina

#### FORMULA

Cada 100 g contiene:

|                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Mucílago de llantén.....                                                                                                                                                                                                                     | 54,200 | g |
| Senósidos A y B.....                                                                                                                                                                                                                         | 0,310  | g |
| Povidona, esencia de naranja, sacarina sódica,<br>ciclamato sódico, aspartamo, sorbitol (polvo),<br>lactato de calcio pentahidrato, manitol,<br>laurilsulfato de sodio, laca aluminica<br>amarillo ocaso y ácido cítrico anhidro c.s.p. .... | 100    | g |

#### ACCION TERAPEUTICA

Regularizador de la función intestinal, tratamiento de la constipación.

#### POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Dosis inicial recomendada en adultos y niños mayores de 12 años: 2 cucharaditas de té disueltas en un vaso de bebida fría (agua o jugo) dos veces por día, antes del desayuno y después de la cena.

Una vez logrado el efecto deseado, reducir la dosis diaria a una

cucharadita por la mañana y otra por la noche, en la forma indicada.

#### CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al Mucílago de llantén.
- Obstrucción intestinal confirmada o sospechada.
- Pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa.
- Apendicitis sospechada o confirmada.
- Dolor abdominal no diagnosticado.
- Estrechez esofágica o disfagia.
- Niños menores de doce (12) años.

La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente evaluada en embarazo y lactancia.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El uso crónico debe efectuarse bajo control médico.

Usar con precaución en embarazo y lactancia.

Debe administrarse con abundante agua para evitar o prevenir el impacto fecal u obstrucción abdominal.



# BETA

TECNOLOGIA  
FARMACEUTICA  
INNOVADORA

LABORATORIOS BETA S.A.

Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.

Director Técnico: Daniel H. Ventura - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 17.514.

Elaborado en Ruta 5 N° 3753 -

Parque Industrial - La Rioja.

255645-j

## EFFECTOS ADVERSOS

En grandes cantidades puede producir flatulencia y/o distensión. Si se administra con poca agua existe riesgo de obstrucción esofágica o intestinal e impacto fecal.

Puede producir fenómenos de hipersensibilidad asociados con la ingesta o inhalación.

## SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital General de Niños "**Dr. Ricardo Gutiérrez**"

Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital General de Niños "**Dr. Pedro de Elizalde**"

Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063.

Hospital Nacional "**Prof. A. Posadas**"

Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777.

Hospital de Pediatría "**Sor María Ludovica**"

Tel.: (0221) 451-5555.

## PRESENTACIONES

Envases con 100 y 200 g.

### Otra presentación:

Comprimidos recubiertos: envases con 30 comprimidos recubiertos.

## CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco, a temperaturas inferiores a los 30 °C.

## MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).**