

MENOCLIM® PRO

PROMESTRIENE

OVULOS - CREMA VAGINAL

Venta bajo receta

Industria Argentina

FORMULAS

Ovulos

Cada óvulo contiene:

Promestriene.....	10 mg
Butilhidroxitolueno, witepsol S 55.....	c.s.

Crema vaginal

Cada 100 g de crema contiene:

Promestriene.....	1 g
Glicerina, ceral PW, miristato de isopropilo, vaselina líquida, germaben II, trietanolamina y agua desionizada c.s.p.	100 g

ACCION TERAPEUTICA

Estrogenoterapia. Código ATC: G03CA09.

INDICACIONES

Ovulos: alteraciones tróficas vulvo-vaginales (sequedad, prurito, dispareunia).

Crema vaginal: alteraciones tróficas vulvares (sequedad, prurito, dispareunia).

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS

Farmacodinamia

Promestriene ejerce efectos estrogénicos locales a nivel de la mucosa del tracto genital femenino inferior, devolviendo su trofismo.

Después de la aplicación vaginal, no se observan efectos sistémicos estrogénicos, particularmente en los órganos sensibles a estrógenos alejados de la vagina.

Farmacocinética

Después de la aplicación cutánea, menos de 1 % de promestriene pasa a la circulación sistémica.

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION

Ovulos

Un óvulo por día, por vía vaginal, en tratamientos de 20 días.

Crema vaginal

Durante la primera semana de tratamiento, aplicar una vez por día una capa fina en la zona vulvar y realizar un leve masaje. Luego, efectuar una aplicación cada dos días hasta la regresión de los síntomas, usualmente a las tres semanas.

La posología se debe adaptar en función de la mejoría obtenida.

Puede ser necesario un tratamiento de mantenimiento.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.
- Utilización de preservativos masculinos de látex durante el tratamiento con MENOCLIM® PRO óvulos.

Generalmente no se recomienda el uso de este medicamento en los siguientes casos:

- Cáncer estrógeno-dependiente (mama, endometrio)
- Asociación con productos espermicidas (ver PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS - **Interacciones**)
- Mujeres en período de lactancia (ver PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS - **Embarazo y lactancia**)



BETA

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA
INNOVADORA

LABORATORIOS BETA S.A.

Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.

Director Técnico: Gustavo R. Potes - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.786.

Elaborado en Ruta 5 N° 3753 -

Parque Industrial - La Rioja.

255519-am

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se requiere supervisión médica durante el curso del tratamiento.

En caso de metrorragia se debe investigar su etiología.

Interacciones

Combinaciones contraindicadas:

• **MENOCLIM® PRO** óvulos y preservativos masculinos de látex: existe riesgo de ruptura del preservativo cuando se usa con sustancias grasas o lubricantes que contienen aceites minerales.

Combinaciones desaconsejadas:

• Espermicidas: todo tratamiento local vaginal es susceptible de inactivar la anticoncepción local espermicida.

Embarazo y lactancia

Embarazo:

Este medicamento no está indicado durante el embarazo.

En el contexto clínico, a diferencia de dietilestilbestrol, los resultados de numerosos estudios epidemiológicos permiten descartar el riesgo de malformación al principio del embarazo. Por lo tanto, el diagnóstico de embarazo durante el tratamiento con estrógeno no justifica la interrupción del tratamiento.

Lactancia:

Como precaución, se debe evitar la administración de este medicamento dada la ausencia de datos sobre el pasaje a la leche materna.

REACCIONES ADVERSAS

Se han reportado en raros casos irritación, prurito local y reacciones alérgicas.

SOBREDOSIFICACION

No se han descrito casos de sobredosificación. En caso de sobredosis o

ingestión accidental, consultar al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital General de Niños "**Dr. Ricardo Gutiérrez**"

Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital General de Niños "**Dr. Pedro de Elizalde**"

Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional "**Prof. A. Posadas**"

Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Pediatría "**Sor María Ludovica**"

Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES

Ovulos: envases con 10 y 20 óvulos.

Crema vaginal: envases con 15 g.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Ovulos: conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 25 °C y al abrigo de la humedad. No congelar.

Crema vaginal: conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 25 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 09.15.