

LIPO PLUS® C

ACIDO FENOFIBRICO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA

Venta bajo receta

Industria Argentina

FORMULA

Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene:

Acido fenofibríco.....	135,00 mg
(equivalente a 178,68 mg de Fenofibrato de colina)	
Sílice coloidal, hidroxipropilmetilcelulosa E3, hidroxipropilmetilcelulosa E5, almidón pregelatinizado, celulosa microcristalina, estearil fumarato sódico,	
Acryl-Eze y antiespumante.....	c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

Contenido

1. Qué es LIPO PLUS® C y para qué se utiliza
2. Antes de tomar LIPO PLUS® C
3. Cómo debe tomar LIPO PLUS® C
4. Posibles efectos adversos
5. Información adicional

1. Qué es LIPO PLUS® C y para qué se utiliza

LIPO PLUS® C contiene como principio activo fenofibrato de colina, una droga que pertenece a un grupo de medicamentos comúnmente conocidos como fibratos. Estos medicamentos se usan para reducir el nivel de lípidos (grasas) en la sangre. Por ejemplo, colesterol y triglicéridos.

LIPO PLUS® C se usa, junto con una dieta baja en grasas y otros tratamientos no médicos como ejercicio y pérdida de peso, para reducir los niveles de lípidos en la sangre.

LIPO PLUS® C puede usarse junto con otros medicamentos, por ejemplo, estatinas, en ciertas circunstancias; cuando una estatina sola no controla los niveles de lípidos en la sangre.

2. Antes de tomar LIPO PLUS® C

No tome LIPO PLUS® C sin consultar antes a su médico en las siguientes circunstancias:

- Si es alérgico al fenofibrato o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (ver FORMULA)
- Si al tomar otros medicamentos ha tenido una reacción alérgica o lesión cutánea causada por la luz solar o por la luz UV (estos medicamentos incluyen otros fibratos y ketoprofeno, un medicamento antiinflamatorio)
- Si tiene enfermedad grave del hígado o del riñón, o problemas en la vesícula biliar
- Si tiene pancreatitis (inflamación del páncreas que provoca dolor abdominal) no provocada por un nivel alto de grasa en sangre
- Si tiene problemas de riñón o hígado
- Si padece inflamación del hígado (hepatitis), con alguno o varios de estos signos y síntomas: coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos (ictericia), aumento de las enzimas hepáticas (en los análisis de sangre), dolor de estómago y picazón
- Si tiene disminución de la actividad de la glándula

tiroidea (hipotiroidismo)

- Si está embarazada o planea embarazarse
- Si está amamantando

Advertencias

Efectos musculares

Deje de tomar LIPO PLUS® C y acuda a su médico inmediatamente si usted experimenta calambres o dolor muscular inexplicable, sensibilidad o debilidad muscular mientras está tomando este medicamento.

- Este medicamento puede causar en raras ocasiones problemas musculares.
- Estos problemas incluyen inflamación y lesión muscular, que puede a su vez causar lesión de riñón o incluso ser mortal.

Su médico puede hacerle un análisis de sangre para evaluar ciertas enzimas que están en sus músculos antes y después de iniciar el tratamiento.

El riesgo de problemas musculares es mayor en algunos pacientes. Consulte con su médico si:

- Tiene más de 70 años
- Tiene enfermedad en sus riñones
- Tiene problemas de tiroides
- Usted o un familiar cercano tiene un problema muscular hereditario
- Usted bebe grandes cantidades de alcohol
- Está tomando medicamentos llamados “estatinas” para bajar el colesterol (como simvastatina, atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina o fluvastatina)
- Ha tenido problemas musculares durante el tratamiento con estatinas o fibratos tales como fenofibrato, bezafibrato o gemfibrozil

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Es importante que informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente alguno de los siguientes medicamentos:

- Anticoagulantes (como warfarina)
- Otros medicamentos usados para controlar los niveles de lípidos en sangre (como estatinas o fibratos). Tomar una estatina al mismo tiempo que LIPO PLUS® C puede aumentar el riesgo de problemas musculares
- Algunos medicamentos para tratar la diabetes (como rosiglitazona o pioglitazona)
- Ciclosporina (un inmunosupresor)

Embarazo y lactancia

Comuníquese a su médico si está embarazada, piensa que está embarazada o está planeando quedar embarazada. Como no hay suficiente experiencia sobre el uso de LIPO PLUS® C en el embarazo, sólo debe usar LIPO PLUS® C si su médico considera que es absolutamente necesario.

Se desconoce si el principio activo de LIPO PLUS® C pasa a la leche materna. Por tanto, no debe usar LIPO PLUS® C si está en período de lactancia o está planeando dar lactancia materna a su bebé.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento no afecta a la capacidad de conducir o utilizar herramientas o máquinas.



BETA

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA
INNOVADORA

LABORATORIOS BETA S.A.
Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.
Director Técnico: Daniel H. Ventura - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 58.060.
Elaborado en Ruta 5 Nº 3753 - Parque Industrial - La Rioja.

255222-bp

3. Cómo debe tomar LIPO PLUS® C

Siga exactamente las instrucciones de administración proporcionadas por su médico. No tome LIPO PLUS® C en dosis más altas, ni por más tiempo que lo indicado por el médico.

Recuerde que además de tomar LIPO PLUS® C es importante que usted:

- Lleve una dieta baja en grasas
- Haga ejercicio regularmente

Ingiera el comprimido con un vaso de agua. No triture ni mastique el comprimido.

La dosis recomendada es 1 comprimido al día.

No se recomienda el uso de LIPO PLUS® C en menores de 18 años.

Pacientes con problemas renales

Si tiene problemas de riñón, su médico puede indicarle que tome una dosis más baja. Consulte a su médico o farmacéutico sobre este tema.

Si olvidó tomar LIPO PLUS® C

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si olvida una dosis, tómela tan pronto pueda, excepto si ya casi es hora de la siguiente; luego vuelva a la pauta de administración habitual. Si olvidara varias dosis, consulte con su médico.

En caso de sobredosis (dosis mayores a las indicadas) o ingesta accidental por parte de un niño, contacte a su médico, o consulte al hospital más cercano o a los siguientes Centros de Toxicología, indicando el medicamento y la cantidad tomada:

Hospital General de Niños “**Dr. Ricardo Gutiérrez**”

Tel: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital General de Niños “**Dr. Pedro de Elizalde**”

Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional “**Prof. A. Posadas**”

Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Pediatría “**Sor María Ludovica**”

Tel: (0221) 451-5555.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, LIPO PLUS® C puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Deje de tomar LIPO PLUS® C y acuda a su médico inmediatamente, si usted nota cualquiera de los siguientes efectos adversos graves - puede necesitar tratamiento médico urgente:

- Reacción alérgica - hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, que puede causar dificultad para respirar
- Calambres, dolor, sensibilidad o debilidad a nivel muscular - estos pueden ser signos de inflamación o daño muscular, el cual a su vez puede causar daño a los riñones
- Dolor intenso en la zona del estómago - esto puede ser una señal de que el páncreas está inflamado (pancreatitis)
- Coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos (ictericia), o un aumento de las enzimas hepáticas - estos pueden ser signos de una inflamación del hígado (hepatitis)

Otros efectos adversos incluyen:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- Diarrea
- Dolor de estómago
- Gases (flatulencia)
- Ganas de vomitar (náuseas)
- Vómitos
- Niveles elevados de enzimas hepáticas (en análisis de sangre)

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Dolor de cabeza
- Cálculos biliares
- Disminución del deseo sexual
- Reacciones en la piel como erupción, picazón, ronchas
- Aumento de creatinina en análisis de sangre
Pancreatitis (inflamación de páncreas que produce dolor abdominal)
- Dolor muscular, inflamación muscular, calambres musculares y debilidad muscular

Si usted experimenta algún efecto adverso, comuníquese a su médico, farmacéutico o enfermera, incluso si se trata de algún efecto adverso no incluido en esta lista.

5. Información adicional

Fecha de vencimiento

NO ADMINISTRAR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE APARECE EN EL ENVASE.

La fecha de vencimiento corresponde al último día del mes que se indica.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 25 °C. Protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACION

Envases con 30 comprimidos recubiertos de liberación prolongada.

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 08.16.

Prospecto para prescripción disponible en www.laboratoriosbeta.com.ar