

# MECANYL® DUO

## GLUCOSAMINA - CONDROITIN SULFATO

GRANULADO

Venta bajo receta

Industria Argentina

### Fórmula

Cada sobre monodosis contiene:

Sulfato de glucosamina policristalino.....	1.884 mg
(equivalente a 1.500 mg de sulfato de glucosamina)	
Condroitín sulfato sódico.....	1.200 mg
Aspartamo, ácido cítrico anhidro, polietilenglicol 6.000, sorbitol polvo, povidona, sacarina sódica, amarillo ocaso y esencia de naranja.....	c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

Conserve esta información. Puede tener que volver a leerla.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

### Contenido

1. Qué es Mecanyl® Duo y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Mecanyl® Duo
3. Cómo tomar Mecanyl® Duo
4. Posibles efectos adversos
5. Información adicional

#### 1. Qué es Mecanyl® Duo y para qué se utiliza

Mecanyl® Duo contiene como principios activos glucosamina y condroitín sulfato, los cuales tienen efectos antiartrósicos y antiinflamatorios.

Mecanyl® Duo está indicado para el alivio de los síntomas de la artrosis y otras enfermedades reumáticas.

#### 2. Antes de tomar Mecanyl® Duo

**No tome Mecanyl® Duo en las siguientes circunstancias:**

- Si es alérgico (hipersensible) a la glucosamina, al condroitín sulfato o a cualquiera de los demás componentes de Mecanyl® Duo.
- Durante el embarazo o si está amamantando.
- Si tiene menos de 18 años de edad.

Si no está seguro de alguna de las situaciones anteriores, por favor contacte a su médico.

### Advertencias

No tome más dosis de la recomendada. No tome Mecanyl® Duo durante más tiempo del que se lo han recetado.

Consulte con su médico acerca de su condición clínica y la posibilidad de uso de este medicamento, en especial si usted tiene insuficiencia cardíaca, renal o hepática, si es alérgico (hipersensible) a los mariscos, o si padece de diabetes.

Si usted tiene fenilcetonuria, consulte a su médico antes de tomar Mecanyl® Duo (Mecanyl® Duo contiene aspartamo que es una fuente de fenilalanina).

### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Consulte a su médico si usted está medicado con anticoagulantes de tipo warfarina, con tetraciclinas, penicilinas o cloranfenicol.

### Embarazo y lactancia

No ha sido estudiado el uso de glucosamina y condroitín sulfato durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento en ambas situaciones.

### Conducción y uso de máquinas

No hay informes respecto a que Mecanyl® Duo pueda afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinarias. Sin embargo, si usted presenta mareos o somnolencia durante el tratamiento, es aconsejable no conducir ni manejar máquinas peligrosas.

### Información importante sobre algunos componentes de Mecanyl® Duo

El granulado para solución oral contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia digestiva a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

#### 3. Cómo tomar Mecanyl® Duo

Siga exactamente las instrucciones de administración de Mecanyl® Duo indicadas por su médico. El podrá ajustarle la dosis de acuerdo a su estado.

La dosis habitual es de un sobre (disuelto en un vaso de agua) una vez al día por vía oral, antes de alguna comida.



# BETA

TECNOLOGIA  
FARMACEUTICA  
INNOVADORA

LABORATORIOS BETA S.A.  
Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.  
Director Técnico: Daniel H. Ventura - Farmacéutico.  
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio  
de Salud. Certificado N° 50.572.  
Elaborado en Ruta 5 N° 3753 -  
Parque Industrial - La Rioja.

255328-1p

## Preparación del producto

Vaciar el contenido de un sobre en un vaso con 200 ml de agua potable a temperatura ambiente; revolver con una cuchara de té constantemente hasta su completa disolución y tomar inmediatamente. La disolución no deberá tomar más de 8 minutos. Una vez disuelto, el aspecto es el de una solución naranja con partículas visibles en suspensión.

## Duración del tratamiento

Mecanyl® Duo no está indicado para el tratamiento de síntomas agudos dolorosos. El alivio de los síntomas (especialmente el alivio del dolor) puede que no se manifieste hasta después de varias semanas de tratamiento.

## Si olvidó tomar Mecanyl® Duo

**No** tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Simplemente tome la próxima dosis a la hora habitual.

**Si usted ha tomado Mecanyl® Duo en dosis que superan las aconsejadas o sospecha una sobredosis, contacte a su médico, consulte a un centro asistencial o comuníquese con los Centros de Toxicología indicando el medicamento y la cantidad tomada:**

Hospital General de Niños “**Dr. Ricardo Gutiérrez**”

Tel: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital General de Niños “**Dr. Pedro de Elizalde**”

Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional “**Prof. A. Posadas**”

Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Pediatría “**Sor María Ludovica**”

Tel: (0221) 451-5555.

## 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Mecanyl® Duo puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Pueden ocurrir: náuseas, malestar abdominal, meteorismo, alteraciones del tránsito intestinal, mareos, somnolencia, cefalea y muy raramente, vómitos y reacciones alérgicas.

Debe interrumpir el tratamiento con Mecanyl® Duo y acudir inmediatamente a su médico o al hospital más cercano si experimenta síntomas de alergia, tales como:

- Hinchazón de cara, lengua o garganta
- Dificultad para tragar
- Urticaria
- Dificultad para respirar

## 5. Información adicional

**NO INGERIR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.**

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

## PRESENTACION

Envases con 30 sobres monodosis.

## CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperaturas comprendidas entre 15 y 30 °C.

## MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).**

**Fecha de la última revisión: 03.14.**

**Prospecto para prescripción disponible en:  
[www.laboratoriosbeta.com.ar](http://www.laboratoriosbeta.com.ar)**