

ULTREX[®] 20 mg ESOMEPRAZOL

COMPRESIDOS GASTRORRESISTENTES

Venta libre

Industria Argentina

Lea con cuidado esta informacion antes de tomar este medicamento

Conserve este prospecto dado que contiene informacion que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿Qué contiene?

FORMULA

Cada comprimido gastrorresistente contiene:

Esomeprazol magnésico dihidrato..... 21,75 mg
(equivalente a 20 mg de esomeprazol)

Lactosa, crospovidona, carbonato de sodio, sílice coloidal, povidona, glicolato sódico de almidón, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, Opadry YS1-7003, antiespumante, Acryl-Eze, laca aluminica D&C amarillo N° 10 y laca aluminica FD&C azul N° 1..... c.s.

ACCION TERAPEUTICA

Reduce la producción de ácido estomacal.

¿Para qué se usa esomeprazol?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor/acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿Qué personas no pueden recibir esomeprazol?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni aquellas personas que necesiten un alivio inmediato de la acidez.

No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿Qué cuidados debe tener antes de tomar este medicamento?

Consulte con su médico si:

- Tiene dificultad o dolor al tragar la comida;
- Tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones;
- Tiene diarrea prolongada o que no mejora;
- Acidez desde hace más de tres meses;
- Acidez con mareos o transpiración;

- Dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello;
- Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- Pérdida de peso inexplicable;
- Dolor de estómago, náuseas o vómitos;
- Trastorno renal y/o hepático.

Dado que los síntomas mencionados pueden deberse a una condición clínica seria, que requiera diagnóstico y tratamiento médico.

Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre.

Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento durante más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debe tener mientras está tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como:

- Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo (gases), somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
- Erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Naproxeno asociado a Esomeprazol puede provocar trastornos renales graves (nefritis tubulointersticial aguda que puede evolucionar a insuficiencia renal);
- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante);
- Digoxina (medicamento para el corazón);



BETA

TECNOLOGIA
FARMACEUTICA
INNOVADORA

LABORATORIOS BETA S.A.
Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.
Director Técnico: Daniel H. Ventura - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio
de Salud. Certificado N° 55.542.
Elaborado en Ruta 5 N° 3753 -
Parque Industrial - La Rioja.

255765VL-a

- Teofilina (medicamento broncodilatador);
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores);
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamento para la infección VIH-SIDA);
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Esomeprazol.

¿Cómo se usa este medicamento?

Es de administración oral en adultos mayores de 18 años. Tome un comprimido con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días. No rompa ni mastique los comprimidos. No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.

No tome por más de 14 días sin consulta médica.

Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

No se debe tomar esomeprazol como medicación preventiva. El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:

Tel: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde:

Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional Prof. A. Posadas:

Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Pediatría Sor María Ludovica:

Tel: (0221) 451-5555.

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:

Tel: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

- ANMAT Responde: 0800 333 1234.
- Ante cualquier duda consultar al 0800 444 2382 (BETA).

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT:

<https://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>
Para más información, el prospecto para prescripción está disponible en: <https://www.laboratoriosbeta.com.ar>

FECHA DE VENCIMIENTO

NO ADMINISTRAR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE APARECE EN EL ENVASE.

La fecha de vencimiento corresponde al último día del mes que se indica.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 30 °C. Proteger de la luz y de la humedad.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACION

Envases con 14 comprimidos gastrorresistentes.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 09.24.